

Гель для десен

ФЛАМЕНА СТОМ

Описание

Рекомендации по применению

Фламена СТОМ – комбинированный препарат для местного применения в стоматологии на основе липосомальной композиции для индивидуального профилактики воспалительных и патологических процессов в деснах, устранения отечности и дискомфорта, восстановления микроциркуляции в тканях десен, а также для сохранения лечебного эффекта после стоматологических процедур.

Компоненты геля обладают бактерицидным, противовоспалительным и регенерирующим действием.

При местном применении образует на поверхности тканей десны тонкую аппликационную пленку с адгезивными свойствами.

Гель разработан специалистами Научной компании «Фламена», с учетом рекомендаций ведущих специалистов - стоматологов.

В основе геля запатентованная формула высокостабильного липосомального дигидрохверцетина (Патент СН 702736 В1, Швейцария)

Состав

Дигидрохверцетин; липосомы из натурального яичного лецитина; глицин; сорбитол; коллоидный кремний; кармеллоза натрия.

Не содержит сахар.

Дигидрохверцетин способствует уменьшению активности остеокластов, обеспечивает снижение структурных потерь костной ткани при патологических процессах в пародонте. Липосомы из натурального яичного лецитина являются идеальным «транспортом» для доставки компонентов геля к клеточным системам тканей полости рта, а лецитин устраняет дефекты мембран клеток.

Показания

Для местного применения на слизистых оболочках полости рта, для устранения дискомфорта, профилактики развития воспалительных и патологических процессов при заболеваниях пародонта, поврежденной слизистой оболочки, заболеланий, протекающих с воспалительной реакцией и болью, таких как:

- стоматит различной этиологии;
- гингивит;
- пародонтит;
- повреждение слизистой оболочки полости рта при ношении зубных протезов;
- травмы слизистой оболочки полости рта;
- хейлит;
- кандидоз слизистой оболочки полости рта;

- оперативные вмешательства в полости рта;
- красный плоский лишай при локализации на слизистой оболочке полости рта;
- поражение слизистой оболочки полости рта при синдроме Стивенса-Джонсона (в составе комплексной терапии).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы

Перед применением геля проконсультируйтесь с врачом.

Гель наносят 1-2 раза в день тонким слоем (0,5-1,0 мм) на поверхность десны или иной участок слизистой оболочки полости рта. Время аппликации от 2-3 до 15 минут. При необходимости аппликацию закрывают повязкой. Допускается применение до 4 раз в сутки с промежутком между аппликациями 3-4 часа.

При заболеваниях пародонта гель следует закладывать в десневые карманы или применять в виде компрессов. Более частое применение не повышает эффективность. По окончании процедуры рекомендуется полоскание.

Особые указания

При появлении первых признаков побочного действия пациенту следует сразу обратиться к лечащему врачу. Гель сле-

дует применять только для местного применения.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не ограничивает психофизическую активность, способность к управлению транспортными средствами и обслуживанию движущихся механизмов.

Условия хранения

Убедитесь в целостности упаковки. Гель должен быть белого цвета, без нарушения однородной структуры. Инородные примеси и/или вкрапления темно-желтого цвета, темно-желтый или коричневый цвет геля являются признаками неправильного хранения или истечения срока годности. Такой продукт подлежит утилизации, применение запрещено. Бежевый или невыраженный светло-желтый цвет свидетельствуют о снижении антиоксидантных свойств композиции и начале окислительных процессов. Применение такого геля нежелательно.

Вскрытую тубу с гелем хранить в прохладном месте и использовать в течение двух недель с момента вскрытия. Во время хранения туба должна быть закрыта колпачком.

Длительное хранение геля желательно в прохладном месте. Замораживание геля не допускается.